

Smittevern i praksis

Hege Gonsholt


Geitedagene 2015, Quality hotel Mastemyr.

Romtveit nordre, Arabygdi

- 700 m.o.h.
- Vinje kommune
- Familiebruk
- Kvote 72 tonn
- Ca 90 mjølkegeiter + påsett

- Avlsbesetning
- Salg av bukkekje

- Støylsdrift juni-september



Nystøyl

- 16 km fra garden
- Nytt støylsfjos i 2014
- Ca 200 mjølkegeiter
- 2 besetninger:
 - Gonsholt/Hauge
 - Mindre/Haugo






Smittevern

– smitte utenfra

Smittesluse

- Heime:
smittesluse brukes både av gardens folk og besøkende
- På støylen:
egen inngang/skifterom til eget bruk. Overtrekkstøy ved inngang til mjølkepall for besøkende.
- Egen inngang til tankbilsjåfør både heime og på støylen.
- Egen utgang for dyr til slakt





Smittevern

- smitte utenfra

Utstyr inn i besetningen

- Flinke og dyktige veterinærer som tenker smittevern!!
- Bruker besetningens tøy/fottøy, handvask før besøk i husdyrrom
- Alltid rent/desinfisert utstyr
- Alltid ny kanyle for hvert dyr

- Annet innkjøpt utstyr: nytt/rent, eventuelt vask i Virkon S.

- Egne mjølkemålere både heime og på støylen



Smittevern

- smitte utenfra

Livdyrhandel

- **Kjøper IKKE inn livdyr**
- Inseminerer 25-30 geiter per år
- Rekrutterer 4-5 egne bukkekje
- Salg av kåra bukkekje (4-8), stor etterspørsel
- God pris for bukkekje med rett kaseingenstatus og høg avlsverdi, men tankekors at så mange velger å kjøpe livdyr framfor å inseminere i egen besetning..
- Bruk av seminbukker og ikke innkjøp av livdyr også i den andre besetningen på støylen.



Smittevern

- spredning av smitte i besetningen

Kjeoppdrett

- Tar fra påsettkje rett etter fødsel
- Egen avdeling for nyfødte
- 8-10 dl råmjølk fra mor i løpet av første levedøgn
- 2 kjebinger, drikkeautomat varm drikke
- I samme rom som geiter, men adskilt med tett skillevegg

- Fokus på godt miljø!
Plass/tørt/reint..





Kje; råmjølk, merking, ørenr.

Født	Mor	Merking	Råmjølk		
1400	3V 12	3054 SØNN KNT	1,0	1,0	2,0
"	"	3054 SØNN S BUKK KNT 1/2 rød	1,0	1,0	2,0
700	"	1029 SØNN VITTE	1,5	1,5	3,0
1700	"	1016 SØNN S BUKK KNT	2,0	2,0	4,0
1300	1/1	806 KNT 1/2 rød	2,0	2,5	4,5
1400	"	0027 SØNN	1,0	1,0	2,0




Smittevern

- spredning av smitte i besetningen

Smittsomme mastittbakterier

- Kjeing på talle, fellesbinge. Kalker og strør med tørr halm etter hver kjeing
- Klipp av hale og jur
- **PCR av tankmjølk** ved start levering – «helhetsbilde»
- Veging med mjølkeprøver en gang per måned første 6 månedene av laktasjonen, siste veging med prøver ca 1 måned før avsining
- **Speneprøver av alle med celletall > 1 mill på GK prøver (inneførringsperioden)**
- S.aur geiter behandles eller utrangeres.



Fullstendig kvalitetsprotokoll

for perioden 01.01.2015 til 20.08.2015

Uttaks- dato	Liter levert	Bakterie/ LS / Unormal mjølk				Fett %	Prot %	Lakt. %	Celle- tall		Avr / Merk	Fryse- punkt		Urea	F-F- Syrrer		K S L
		A	K	Ant	Anmerk				1000	K		K	K				
21.01.15	327	T		1		4.95	3.68	4.93	270			563			0.1		
04.02.15	536	T		3		4.56	3.35	4.92	260			564			0.1		
11.02.15	611	T		1		4.17	3.24	4.86	170			562			0.1		
25.02.15	724	T		1		4.06	3.12	4.78	240			562			0.1		
12.03.15	721	T		1		3.94	3.03	4.66	280			558			0.2		
19.03.15	723	T		1		3.69	3.02	4.66	220			564			0.1		
26.03.15	678	T		1		3.87	3.02	4.66	280			565			0.3		
09.04.15	701	T		2		3.98	3.01	4.60	280			565			0.1		
16.04.15	714	T		3		4.08	3.07	4.61	290			564			0.1		
23.04.15	501	T		3		4.14	3.12	4.62	370			565			0.2		
07.05.15	695	T		1		4.32	3.20	4.58	410			565			0.3		
14.05.15	689	T		1		4.26	3.18	4.57	420			564			0.4		
21.05.15	720	T		1		4.46	3.19	4.59	430			563			0.2		
28.05.15	660	T		4		4.39	3.17	4.55	1030			565			0.4		
04.06.15	610	T		4		4.42	3.19	4.52	540			566			0.4		
11.06.15	587	T		1		4.33	3.21	4.47	750			564			0.2		
18.06.15	615	T		1		4.34	3.31	4.44	740			563			0.2		
25.06.15	455	T		2		4.43	3.29	4.41	990			557			0.2		
01.07.15	609	T		2		4.38	3.36	4.43	830			560			0.1		
23.07.15	515	T		3		4.64	3.39	4.41	940			558			0.2		
30.07.15	394	T		1		4.84	3.36	4.42	840			557			0.2		

(*) Veid middel for året, analyseverdier.

(**) Geometrisk middel for året, analyseverdier.

(***) Uveid middel for året, avregningsverdier.

Smittevern

- spredning av smitte i besetningen

Parasitter

- Prøver ettersommer/høst
- Parasittpakker (avføringsprøver, 5 dyr)
 - Voksne
 - Kje
- Eventuell behandling i samråd med veterinær



<http://www.animalia.no/upload/BILDER/HT-sau/parasittpakke.jpg>

Hvilken «trussel» utgjør disse???



**Neste generasjon geitebønder må også ha friske dyr..
ta ansvar for godt smittevern!!!**

