

## **VEILEDNING I OPPSETT AV PLAN FOR KONTROLLDAGER OG UTTAK AV MJØLKEPRØVER TIL GEITEKONTROLLEN**

1. Det skal settes opp en årlig plan for kontrolldager og uttak av mjølkeprøver.
2. Planen skal legges opp slik at det blir gjennomført minimum 5 kontroller per år og minimum 3 uttak av mjølkeprøver til laboratorieanalyser for hver enkelt geit.
3. Mjølkemåling/Kontroll
  - En kontroll består av mjølkemåling kveld og morgen.
  - Den første kontrolldatoen for enkeltgeiter i ny laktasjon, skal ikke bli tatt før den 15. dagen etter kjeingsdatoen.
  - Mjølka skal IKKE veies når geita er sjuk på veiedagen.
  - De 3 første kontrollene i ny laktasjon bør tas med 1 måneds mellomrom.
  - Minst 2 kontroller bør gjennomføres i beiteperioden.
  - Siste kontroll i laktasjonen skal tas mens geitene enda er i normal produksjon, dvs. før eventuelle tiltak for å avlate geitene blir satt inn.
4. Prøveuttak
  - Prøven skal tas av kvelds- eller morgenmålet eller av begge mål, men slik at alle prøvene fra en kontroll stammer fra samme målet. En må oppgi hvilket mål prøvene stammer fra.
  - Plan for prøveuttak for den enkelte besetning må ta utgangspunkt i kjeingstidspunkt slik at følgende kriterier blir oppfylt:
    - Alle geiter skal ha minimum 3 prøveuttak hver. Det betyr at det i flokken vil være behov for å ta prøveuttak 4 ganger og kanskje enda flere ganger ved spredt kjeing.
    - Prøve til analyse kan tas så lenge geita mjølkes to ganger daglig og har normal mjølk. Det må ikke sendes prøve av råmjølk. Etter kjeing anbefales å vente 3 uker før prøveuttak til analyse.
    - Minst en av prøvene tas før beiteslepp.
    - Minst en av prøvene tas i beiteperioden.