



ENKELTSPENEPØVER KU

Analysemetode: 9968 Analyse av speneprøver
Prisliste finnes på <http://medlem.tine.no>

Journalnr.: _____

Mottaksdato: _____

TINE Mastittlaboratoriet i Molde • Postboks 2038, 6402 Molde • Telefon: 918 66 600 • E-post: mastittlab.molde@tine.no

Eiers produsentnummer (10 siffer)

Dato for prøveuttak

Eiers navn: Adresse: Postnr.: Poststed:

Kryss av for prøvetaker:
Eier Veterinær Rådgiver

Veterinærnummer: Veterinærens navn: E-post veterinær:

Veterinær-i.d. må fylles ut for at veterinæren skal få analyseresultatene.
Kryss av hvis prøva fryses før innsending Rekvirentens signatur

Opprinnelsesmerke på ku (12 siffer)

Temp. (1 desimal)

Allmenntilstand 1=Normal 3=Tydelig påkjent
2= Litt påkjent 4=Sterkt påkjent

Årsak til prøveuttak:

1=Klinisk mastitt alvorlig/moderat	5=Kontroll etter tidligere behandling	9=Kontroll av dyr ved kjøp og salg	13=Forsøk (etter avtale)
2=Mild klinisk mastitt	6=Mye klinisk mastitt/mastittkontroll	10=Fellesbeite	14=Kontroll ved avsining
3=Subklinisk mastitt, høyt celletall	7=Høyt celletall tankmelk	11=Kontroll gr. B-streptokokker	15=Kontroll 6 dager etter kalving
4=Mistanke mastitt	8=Høyt bakterietall tankmelk	12=Annet	

Kliniske funn	Symptom jur/spener	HF = Glass 1	VF = Glass 2	HB = Glass 3	VB = Glass 4
	Akutte symptomer				
	Kroniske symptomer				
	Akutt speneskade				
	Kronisk speneskade				
	Sekretforandringer				
	CMT (Shalm) i skala 1-5 Må utføres FØR melking				
	Tidligere mastitt				
Behandling ved prøvetaking	Lokal behandling med:				
	Generell behandling med:				
Er kua/juret behandlet med antibiotika siste uka før prøvetaking?		Nei <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Dato hvis ja: <input type="text"/>	<input type="text"/>

Andre notater: _____

Fylles ut av laboratoriet					
	Bakteriehemmende stoff				
	Kløverblad				
	Følsomhet for: Penicillin				
	Trimet/sulfa				
	Amox/klav				
	Ampicillin				
	Andre				
	Bakteriefunn				

Uttak av spenep prøver



TINE Mastittlaboratoriet Molde
Postboks 2038
6402 Molde
Telefon: 918 66 600
E-post: mastittlab.molde@tine.no

Prøvene tas slik:

- Glass 1: Høyre framspene
- Glass 2: Venstre framspene
- Glass 3: Høyre bakspene
- Glass 4: Venstre bakspene

OBS:


- Ta prøve fra spene med synlig mastitt til slutt for å hindre "smitte" fra glass til glass.
- Sørg for at jur og spener er tørre under prøvetakingen!



- Grundig håndvask!
- Rene og TØRRE hender



- Rene og TØRRE spener!



- Melk ut 10-15 ml i prøve kopp



- Gni spenespiss med 70% sprit e.l.



- Hold glasset på skrå og pass på at strålen går rett i glasset uten søl. Melkesøl tørkes straks!
- Fyll glasset maks $\frac{3}{4}$ fullt
- Nedre del av korken og kanten av glasset MÅ IKKE komme i kontakt med fingre, gulv, ku e.l.



- Legg prøven kjølig så fort som mulig. Den kan med fordel fryses før sending
- Prøver tatt fredag, lørdag eller søndag fryses før sending mandag.

- Husk frimerke på esken 😊

GODT JUR!

Ta alltid spenep prøver:

- Før avsinning av alle kyr med geometrisk middel over 100.000
- Av sinbehandla kyr 6 dager etter kalving
- Av alle synlige mastitter
- Av alle mastitter som behandles
- Ved kjøp og salg

Resultater av analyse av spenep prøver finner du på Helseutskriften og <http://medlem.tine.no>

Helseoversikten – verdens beste mastittstyringsverktøy!



03.04.2009